

胃癌ラムシルマブ・パクリタキセル療法

申請日 : 年 月 日

診療科	外科
-----	----

レジメンNo S-S-03-A

プロトコール名		略名	1クールの日数	
胃癌ラムシルマブ+パクリタキセル療法		RAM+PTX	28 日	
適応病名	胃癌	所要時間	150 分	
適応分類	<input type="checkbox"/> 初発 <input checked="" type="checkbox"/> 進行 ・ 再発			
番号	抗癌剤名	1日投与量	投与法	投与日 (d1, d8等)
1	ラムシルマブ	8mg/kg	div	d1, d15
2	パクリタキセル	80mg/m ²	div	d1, d8, d15

癌化学療法処方			
投与日	薬品名	投与経路(ルート等)	投与時間
day1, day15	ソリタT3 200mL+メトクロプラミド10mg	div	分
	①d-クロルフェニラミン5mg+生食 20mL	iv	分
	②パロノセトン0.75mg+デキサメタゾン6.6mg+5% ブドウ糖液100mL	div	30分
	③ラムシルマブ8mg/kg+生食250mL (総量250mLにして)	div	60分
	④パクリタキセル80mg/m ² +生食250mL (総量250mLにして)	div	60分
day8	ソリタT3 200mL+メトクロプラミド10mg	div	分
	①d-クロルフェニラミン5mg+生食 20mL	iv	分
	②パロノセトン0.75mg+デキサメタゾン6.6mg+5% ブドウ糖液100mL	div	30分
	④パクリタキセル80mg/m ² +生食250mL (総量250mLにして)	div	60分

コメント

サイラムザ	: 0.22μmのフィルターを用いて投与。調製後13時間以内に投与終了。 2回目以降は30分に短縮可能。希釈後の濃度は0.4~4mg/mL。
パクリタキセル	: 0.22μmのフィルターを用いて投与